

Els consumidors d'opiacis: un grup vulnerable en temps de pandèmia

El menor coneixement de determinats aspectes sobre la salut, així com l'estigma i la discriminació dels consumidors d'opiacis propicia que aquest grup siga més vulnerable a patir les conseqüències de l'epidèmia de COVID-19. Proporcionar-los els tractaments i mitjans adequats, fins i tot a domicili, és un desafiament molt important per prevenir possibles brots de transmissió sanguínia d'altres virus.

Durant la pandèmia de COVID-19 és molt possible que es restringeixen determinats serveis assistencials que es presten als consumidors d'opiacis, com el tractament amb agonistes opiacis com la metadona, els programes d'agulles i xeringues, així com altres programes importants de tractament que inclouen el consell o assessorament terapèutic durant els períodes d'abstinència.

Perquè el tractament no es veja interromput, els professionals han d'adoptar canvis en les formes de proporcionar-lo. Per exemple, han de valorar si els pacients tractats amb buprenorfina sublingual i metadona se'ls pot administrar buprenorfina depot mensual, o si als tractats amb naloxona se'ls pot proporcionar aquesta substància a domicili per evitar els riscos de les sobredosi, sobretot si estan infectats pel SARS-CoV-2. Cal tenir en compte també que un dels perills que corren aquests pacients és que en el seu intent de assegurar-se la provisió i el consum de drogues, descuiden les mesures de protecció

enfront de la COVID-19. Per això, els professionals han d'informar a aquests pacients sobre els símptomes de la malaltia, la necessitat d'utilitzar mesures de protecció i de distanciament social, així com l'obligatorietat de procedir al seu aïllament en cas que s'infecten, però a el mateix temps tranquil·litzant-los i garantint-los que continuaran rebent el tractament apropiat a pesar de patir la malaltia.



Article en anglés::

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7201394/>